Inchiodamento Endomidollare v/s Sostituzione Protetica nelle Fratture Laterali del Collo del Femore nel Paziente Anziano

Luigi Bisogno¹,
Marco Caforio^{1,2},
Patrizia Mantelli²,
Pietro Maniscalco²

¹ Clinica Scarnati,
Cosenza

² Ortopedia e
Traumatologia,
AUSL Piacenza

INTRODUZIONE

Le fratture laterali del collo femorale interessanti la popolazione anziana con ossa osteoporotiche sono in genere molto comminute, instabili, associate ad elevata morbilità e mortalità sia peri-operatoria che nei mesi successivi al trauma. Ad oggi il trattamento conservativo con trazione e immobilizzazione prolungata è pressoché abbandonato. L'inchiodamento endomidollare anterogrado e la sostituzione protesica, endoprotesi o artroprotesi, rappresentano invece le strategie chirurgiche più indicate, con vantaggi e svantaggi da valutare caso per caso in relazione alla frattura, alle caratteristiche del paziente e alle sue esigenze funzionali.

Scopo di questo studio prospettico è confrontare, clinicamente, radiograficamente e funzionalmente le due tipologie di intervento mediante i risultati preliminari a breve termine ed indentificare, secondo la nostra esperienza, l'efficacia di una metodica a discapito dell'altra.

MATERIALI e METODI

Da Maggio 2015 a Luglio 2015 presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia della Clinica Scarnati di Cosenza abbiamo rivalutato a breve termine i pazienti da noi trattati nei 3 mesi precedenti (Febbraio - Aprile 2015) per fratture laterali del collo del femore; abbiamo identificato due gruppi di pazienti, tutti di età maggiore di 70 anni, escludendo i casi di fratture patologiche, fratture instabili (secondo la classificazione Kyle e Gustilo ≥ 3) e i pazienti che presentassero già prima del trauma evidenti difficoltà deambulatorie, diabete mellito tipo 2, immunodepressione o deterioramento cognitivo (Mini-Mental State Examination ≥ 26). La scelta della procedura chirurgica è avvenuta in cieco: nel primo gruppo sono stati inclusi i pazienti sottoposti ad intervento di osteosintesi con chiodo endomidollare, nel secondo quelli sottoposti a sostituzione protesica. Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stesso operatore con chiodo Evonail (Bioimpianti, Italia) o protesi Korus (Biomimpianti, Italia) e la fisioterapia iniziale, nei primi 30 giorni post-operatori, è stata effettuata dalla stessa equipe fisioterapica della nostra clinica. Ogni caso è stato rivalutato a 1, 2 e 3 mesi sia radiograficamente (proiezione antero-posteriore e laterale), mettendo in luce eventuali complicanze meccaniche (fratture secondarie, mobilizzazione, cut-out, jamming) o biologiche (eventuali infezioni), e clinicamente: articularità, dolore, morbilità, soddisfazione del paziente (secondo la scala Harris Hip Score - HHS) e i tempi di ripresa del carico completo (Physical Functioning Rasch Scale - versione italiana SF-36)

RISULTATI

Sono stati quindi confrontati 20 pazienti (15 femmine e 5 maschi, età media 78.5 ± 7 anni) appartenenti al primo gruppo con 20 pazienti (13 femmine e 7 maschi, 16 endoprotesi e 4 artroprotesi, età media 75.3 ± 4 anni) appartenenti al secondo gruppo. Tutti i pazienti si sono ripresentati ai controlli di follow-up e i risultati ottenuti a 3 mesi post intervento sono stati i seguenti: primo gruppo con valori medi di HHS 82.5 ± 6 e SF-36 di 54.2 ± 4 e secondo gruppo con valori medi di HHS 81.3 ± 4 e SF-36 di 56.1 ± 7 . Non si sono verificati casi di fallimenti meccanici dell'impianto o fallimenti biologici quali infezioni.

Miglioramento HHS nei primi 3 mesi

Miglioramento SF-36 nei primi 3 mesi

CONCLUSIONI

In questo studio prospettico, sebbene i risultati da noi ottenuti siano a breve termine, abbiamo riscontrato un recupero lievemente più rapido nei pazienti protesizzati. L'assenza di dolore in questi pazienti era già presente a poche settimane dall'intervento, diversamente al gruppo sottoposto a sintesi dove il dolore, anche se tollerabile o ben controllato con i comuni FANS, persisteva più a lungo.

Sintesi e protesizzazione sono scelte terapeutiche diverse tra loro sia per il tipo di intervento, compresa via di accesso e sanguinamento, che per le modalità di fisioterapia da affrontare nel postoperatorio. Tuttavia i risultati a breve termine, nella nostra esperienza, sono sostanzialmente sovrapponibili.

Bibliografia:

S. Boriani, F. De Iure, G. Bettelli, L. Specchia et al. The results of a multicenter Italian study on the use of the Gamma nail for treatment of pertrochanteric and subtrochanteric fractures: a review of 1181 cases Chir. Org. Mov., LXXIX (1994), pp. 193-203